Name: _____

Abiturprüfung 2016

Physik, Grundkurs

Aufgabenstellung:

Aufgabe: Der radioaktive Zerfall des Caesiums-137

In dieser Aufgabe geht es um das radioaktive Isotop Caesium-137, um sein Folgeprodukt Barium-137 sowie um Prozesse, die im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall des Caesiums-137 auftreten.

Teilaufgabe 1: Der Zerfall des $^{137}_{55}\text{Cs}$ in $^{137}_{56}\text{Ba}$

Abbildung 1 zeigt das Zerfallsschema für den natürlichen radioaktiven Zerfall des $^{137}_{55}\text{Cs}$ in $^{137}_{56}\text{Ba}$.

Abbildung 1: Zerfallsschema für den Zerfall des $^{137}_{55}\text{Cs}$ in $^{137}_{56}\text{Ba}$

a) • Geben Sie die zugehörige Kernumwandlungsgleichung für den Zerfall des $^{137}_{55}\text{Cs}$ in $^{137}_{56}\text{Ba}$ an.

• Beschreiben Sie den bei dieser Umwandlung im Kern ablaufenden Prozess (einschließlich der zu diesem Prozess gehörenden Umwandlungsgleichung).

b) Bestimmen Sie die maximale Energie der dabei vom $^{137}_{55}\text{Cs}$ ausgesandten Teilchen.

(11 Punkte)

Name: _____

Teilaufgabe 2: Die Halbwertszeit des angeregten $^{137}_{56}\text{Ba}^*$

Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass beim radioaktiven Zerfall des $^{137}_{55}\text{Cs}$ in 94,6 % der Fälle das angeregte Barium-Isotop $^{137}_{56}\text{Ba}^*$ entsteht, das anschließend mit der Halbwertszeit $T_{1/2\text{Ba}} = 155 \text{ s}$ in den Grundzustand $^{137}_{56}\text{Ba}$ übergeht.

Das zu einer experimentellen Ermittlung dieser Halbwertszeit nötige $^{137}_{56}\text{Ba}^*$ gewinnt man mit Hilfe eines sogenannten Isotopengenerators, der die langlebige Muttersubstanz $^{137}_{55}\text{Cs}$ enthält, aus der fortlaufend sowohl direkt das stabile $^{137}_{56}\text{Ba}$ als auch das zu untersuchende angeregte $^{137}_{56}\text{Ba}^*$ hervorgeht. Das so entstandene Barium wird mit Hilfe einer geeigneten Elutionsflüssigkeit aus dem Isotopengenerator herausgelöst (Abbildung 2). Die austretende Flüssigkeit, das Eluat, wird in einem Reagenzglas aufgefangen und die abgegebene Gamma-Strahlung von einem Geiger-Müller-Zählrohr registriert.

Abbildung 2: Der Isotopengenerator

Im Experiment wird die Zählrate Z (Zahl der Impulse pro 30-s-Intervall) alle 30 s notiert. In der Tabelle 1 sind die Messwerte dargestellt (die Messwerte sind bereits um den Nulleffekt bereinigt).

t in s	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510
Z in $\frac{1}{30 \text{ s}}$	319	271	233	206	193	155	150	123	117	99	74	62	59	48	46	43	39

Tabelle 1: Zählraten zur Bestimmung der Halbwertszeit des angeregten Bariums $^{137}_{56}\text{Ba}^*$

Name: _____

a) Zeichnen Sie die Messwerte und eine Ausgleichskurve in das vorgefertigte Diagramm ein.

Abbildung 3: Zeitliche Abnahme der Aktivität des $^{137}_{56}\text{Ba}^*$

- b) Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man prüfen kann, ob es sich bei der Ausgleichskurve um eine Exponentialkurve handelt.
- c) Ermitteln Sie anhand der Ausgleichskurve die Halbwertszeit $T_{1/2}$ für die Zählraten als Mittelwert aus drei verschiedenen Ablesungen.

(13 Punkte)

Name: _____

Teilaufgabe 3: Die Herstellung von $^{137}_{55}\text{Cs}$

Caesium-137 entsteht in Kernreaktoren zur Energiegewinnung. Eine bei diesem Prozess auftretende Kernreaktion lautet:

Tabelle 2 gibt die Massen der an dieser Reaktion beteiligten Partner an:

Reaktionspartner	Ruhemasse m (in atomaren Einheiten u)
freies Neutron: ${}^1_0\text{n}$	1,008665 u
Uran-235: $^{235}_{92}\text{U}$	234,993461 u
Cäsium-137: $^{137}_{55}\text{Cs}$	136,876918 u
Rubidium-96: $^{96}_{37}\text{Rb}$	95,913976 u

Tabelle 2: Massen der Reaktionspartner beim Entstehungsprozess des Caesiums-137

Die atomare Masseneinheit beträgt $1 \text{ u} = 1,660539 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

- a) • Berechnen Sie für jede Seite der Kernreaktionsgleichung (*) die Gesamtmasse der beteiligten Partner.
- Bestimmen Sie die Massendifferenz Δm in kg.
[Zur Kontrolle: $\Delta m \approx 3 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$]
- b) • Berechnen Sie die in der Kernreaktionsgleichung angegebene Energie ΔE mit Hilfe der Gleichung $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$, wobei c die Lichtgeschwindigkeit darstellt.
- Geben Sie den Wert für ΔE in der Einheit J (Joule) und eV (Elektronenvolt) an.

(14 Punkte)

Name: _____

Teilaufgabe 4: Das radioaktive Gleichgewicht des Cs-Ba*-Gemisches im Isotopengenerator

[Hinweis: Im Folgenden bezieht sich der Index „1“ auf die Muttersubstanz $^{137}_{55}\text{Cs}$ und der Index „2“ auf die Tochtersubstanz $^{137}_{56}\text{Ba}^*$; „A“ bezeichnet die Aktivität der jeweiligen Substanz, mit „N“ kann – bei Bedarf – die Anzahl der Atome selbst bezeichnet werden.]

Die Halbwertszeit des Caesiums-137 beträgt $T_{1/2\text{Cs}} = 30,17 \text{ a}$; im Isotopengenerator befinden sich $N_1(0) = 3,00 \cdot 10^{14}$ Caesium-Atome.

a) Berechnen Sie die Aktivität $A_1(0)$ des $^{137}_{55}\text{Cs}$.

[Zur Kontrolle: $A_1(0) = 2,18 \cdot 10^5 \text{ Bq}$]

b) Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf des Graphen der Aktivität $A_2(t)$ des Bariums:

Abbildung 4: Zeitlicher Verlauf der Aktivität $A_2(t)$ des Bariums

Name: _____

- *Ermitteln Sie anhand der Abbildung 4 die Aktivität A_2 , die sich nach hinreichend langer Zeit einstellt.*
- *Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Wert der Aktivität des Caesiums aus Teilaufgabe 4a).*

(12 Punkte)

Zugelassene Hilfsmittel:

- Physikalische Formelsammlung
- Taschenrechner (wissenschaftlicher Taschenrechner ohne oder mit Grafikfähigkeit/CAS-Taschenrechner)
- Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung